

Recommended Adult Dose: Take 2 tablets 2 times daily or as recommended by your healthcare practitioner. **Risk Information:** Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant, breastfeeding, have gallstones, a bile duct obstruction, stomach ulcers or excess stomach acid, or are taking antiplatelet medication or blood thinners. Consult your healthcare practitioner if symptoms worsen. Hypersensitivity has been known to occur; in which case, discontinue use. Some people may experience mild gastrointestinal disturbances such as diarrhoea, abdominal pain, heartburn, nausea and vomiting; in which case, discontinue use. **Keep out of the reach of children.** Use only if safety seal is intact. Store in a cool, dry place.

Dose recommandée pour adultes : Prendre 2 comprimés 2 fois par jour ou selon les recommandations de votre professionnel de la santé. **Mention des risques :** Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez, si vous souffrez de calculs biliaires, d'une obstruction du canal cholédoque, d'ulcères gastriques ou d'un excès d'acide gastrique, ou si vous prenez des antiagrégants plaquettaires ou des anticoagulants. Consultez votre professionnel de la santé si les symptômes s'aggravent. Une hypersensibilité peut se manifester. Si tel est le cas, cesser l'utilisation. Certaines personnes peuvent éprouver des troubles gastro-intestinaux modérés tels que la diarrhée, des douleurs abdominales, des brûlements d'estomac, de la nausée ou des vomissements. Si tel est le cas, cesser l'utilisation.

Garder hors de la portée des enfants. Utiliser seulement si le sceau de sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité.



Scan to learn about our quality excellence
Scannez pour vous informer sur l'excellence de la qualité

Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity.
Il est possible que le contenu ne remplisse pas la bouteille afin de tenir compte de l'étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.



V1 355-60C
Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8
seroyal.ca



GENESTRA
BRANDS®

PhosCholine Complex

Helps to relieve joint pain and swelling associated with mild to moderate osteoarthritis of the knee. Temporarily relieves the pain of mild to moderate osteoarthritis of the knee in as little as 5 days.

Aide à soulager les douleurs articulaires et l'enflure associées à l'arthrose légère ou modérée du genou. Soulage temporairement la douleur associée à l'arthrose légère ou modérée du genou en 5 jours seulement.

60 DELAYED-RELEASE TABLETS
60 COMPRIMÉS À ACTION RETARDÉE

NPN 80080523

EACH TABLET CONTAINS:

Phosphatidylcholine (from *Glycine max* seed)..... 187.5 mg
Curcumin (from *Curcuma longa* rhizome)..... 50 mg
ApresFlex™ Boswellia (*Boswellia serrata*) Gum Oleoresin Extract (16:1) ... 25 mg
(400 mg Dried Equivalent, 20 % 3-Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid)

CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT :

Phosphatidylcholine (provenant de graines de *Glycine max*) 187,5 mg
Curcumine (provenant de rhizome de *Curcuma longa*) 50 mg
ApresFlex™ Extrait d'oléorésine de boswellie (*Boswellia serrata*) (16:1) ... 25 mg
(Équivalent sec de 400 mg, 20 % d'acide 3-acétyl-11-céto-beta-boswellique)

Non-Medicinal Ingredients: Cellulose, hypromellose, croscarmellose sodium, silica, delayed-release tablet coating (ethylcellulose, ammonium hydroxide, medium-chain triglycerides, oleic acid, sodium alginate, stearic acid), ascorbyl palmitate
Ingrédients non médicinaux : Cellulose, hypromellose, croscarmellose sodique, silice, enrobage de comprimé à action retardée (éthylcellulose, hydroxyde d'ammonium, triglycérides à chaîne moyenne, acide oléique, alginate de sodium, acide stéarique), palmitate d'ascorbyle

Contains: Soy
Contient : Soja

ApresFlex™ is a trademark of Laila Nutraceuticals. US Patent #8,551,496 and other patents pending. / ApresFlex™ est une marque de commerce de Laila Nutraceuticals. Brevet américain #8 551 496 et d'autres brevets en instance.